

Estándares de uso adecuado de la artrodesis vertebral

AETSA 2007/06 ISBN: 978-84-96990-38-8

Anexo 5 al informe

Juicio sobre el uso adecuado de la artrodesis vertebral



NOTA 1.- La última casilla a la derecha de la escala de votación, contiene la mediana en negrita calculada para el escenario.

NOTA 2.- La última casilla en negrita junto a la mediana, contiene A, D ó I, si para en el escenario se obtuvo la calificación de Acuerdo, Desacuerdo ó Indeterminado respectivamente.

NOTA 3.- Encima de la escala de votación figura el resumen de las votaciones de todos los panelistas para el escenario.

CALIFICACION DEL ESCENARIO: "INADECUADO" → 

CALIFICACION DEL ESCENARIO: "DUDOSO" → 

CALIFICACION DEL ESCENARIO: "ADECUADO" → 

Estenosis sin espondilolistesis

Sin comorbilidad
 Duración de síntomas < 6 meses
 Extensión de la estenosis por diagnóstico por imagen ≤ 2 niveles

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>8 1 0 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>8 1 0 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>5 2 0 0 0 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>6 1 0 1 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (1-4) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>6 2 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>6 1 0 1 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>3 2 1 1 0 0 1 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | <u>1 3 0 1 2 0 1 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (5-8) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>3 1 1 1 2 0 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>2 1 1 1 2 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>2 1 2 0 0 2 0 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>1 1 2 0 1 1 1 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | (9-12) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>7 2 0 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>6 1 1 1 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>3 2 2 0 0 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | <u>3 2 1 0 1 2 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | (13-16) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>5 2 2 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>3 2 1 2 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | <u>2 2 1 2 0 0 0 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>1 2 0 2 1 1 1 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (17-20) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>3 1 1 0 3 0 0 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>2 0 1 1 1 1 2 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | <u>1 1 1 1 1 2 0 1 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>1 1 1 1 0 0 2 3 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7D | (21-24) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>3 0 1 2 3 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>2 1 1 2 2 1 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>1 2 1 0 2 2 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>1 2 0 0 2 2 2 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | (25-28) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>3 0 1 1 4 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>1 1 0 1 4 2 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5A | <u>0 2 1 0 2 2 0 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>0 2 0 0 2 0 3 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (29-32) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>1 1 0 0 2 2 1 1 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 1 1 0 2 0 4 0 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 2 0 2 1 1 1 2</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 2 0 2 0 1 2 2</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (33-36) |

Estenosis sin espondilolistesis

Sin comorbilidad
 Duración de síntomas < 6 meses
 Extensión de la estenosis por diagnóstico por imagen >2 niveles

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 2 4 0 0 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | (37-40) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 1 0 1 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 3 2 2 0 0 0 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 1 2 1 0 2 0 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | (41-44) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 3 2 0 0 3 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 2 1 1 0 3 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 2 1 2 0 0 2 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 1 2 0 1 0 2 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | (45-48) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 3 2 0 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 3 1 0 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | (49-52) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 2 0 1 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 2 2 1 2 0 0 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 2 1 0 2 1 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | (53-56) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 3 1 1 0 3 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 0 2 0 0 2 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6D | 1 1 2 0 1 2 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 1 2 0 0 0 3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7D | (57-60) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 3 0 1 3 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 2 1 1 2 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 2 2 0 1 2 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 2 0 0 2 2 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | (61-64) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 3 0 1 0 4 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 1 1 1 1 3 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 2 2 0 1 1 0 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | 0 2 0 0 2 0 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (65-68) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 1 1 0 1 1 2 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 1 1 0 2 1 3 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 2 0 2 0 1 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (69-72) |

Estenosis sin espondilolistesis

Sin comorbilidad
 Duración de síntomas ≥ 6 meses
 Extensión de la estenosis por diagnóstico por imagen ≤ 2 niveles

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 3 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 1 1 2 0 0 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | (73-76) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 1 1 0 1 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 2 1 2 1 1 0 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 1 0 3 1 0 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (77-80) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 3 0 2 0 1 0 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3D | 2 0 1 1 2 0 0 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | 2 0 2 1 0 1 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4D | 1 0 1 1 0 3 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (81-84) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 0 4 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 0 1 2 0 3 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (85-88) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 1 3 4 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | 0 1 2 2 1 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 0 5 1 1 0 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 0 0 1 3 0 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (89-92) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 1 0 3 1 1 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4D | 0 1 1 1 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 2 2 1 1 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 0 0 2 0 2 1 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (93-96) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 1 2 0 1 2 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | 1 0 0 2 0 3 1 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (97-100) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 0 2 1 0 1 1 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6D | 0 1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 1 1 1 2 0 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 1 1 1 0 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8I | (101-104) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 0 1 1 0 1 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 1 0 1 1 1 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8I | 0 0 0 1 0 2 0 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8I | 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9A | (105-108) |

Estenosis sin espondilolistesis

Sin comorbilidad
 Duración de síntomas ≥ 6 meses
 Extensión de la estenosis por diagnóstico por imagen > 2 niveles

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 3 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (109-112) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 1 2 0 2 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 1 3 0 1 0 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 0 1 2 1 0 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | (113-116) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 3 1 1 0 1 0 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3D | 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4D | 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (117-120) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 3 1 0 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 1 1 4 1 0 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 1 1 2 0 2 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (121-124) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 2 2 4 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | 0 2 2 0 2 2 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 0 5 1 1 0 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 0 0 1 1 2 2 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (125-128) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 1 0 3 1 1 0 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4D | 0 1 1 1 0 1 3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 3 1 1 1 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | 0 0 1 1 0 1 3 0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (129-132) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 1 1 0 3 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 0 2 1 0 1 1 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6D | 1 0 0 2 0 1 3 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (133-136) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 0 2 1 0 1 1 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6D | 0 1 1 0 0 1 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 1 1 1 1 0 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8I | 0 0 0 1 1 0 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8A | (137-140) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 0 1 1 0 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 1 0 1 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8I | 0 0 0 1 0 1 1 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8A | 0 0 0 0 1 0 2 0 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9A | (141-144) |

Estenosis sin espondilolistesis

Con comorbilidad
 Duración de síntomas < 6 meses
 Extensión de la estenosis por diagnóstico por imagen ≤ 2 niveles

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|--|--|--|--|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 3 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (145-148) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 3 0 1 0 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 2 3 0 3 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | (149-152) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 3 1 1 1 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 3 2 1 0 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 1 2 2 0 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 1 3 0 0 3 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | (153-156) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 4 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | (157-160) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 2 3 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 2 2 1 0 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 2 2 2 0 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | (161-164) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 0 1 2 2 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 1 1 2 0 1 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4D | (165-168) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 3 0 0 3 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 2 1 1 2 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 2 1 1 1 3 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 2 0 1 1 3 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | (169-172) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 2 0 1 2 2 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 1 1 1 3 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 2 1 1 2 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 2 0 1 1 1 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (173-176) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | 0 1 2 1 0 3 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 2 1 1 1 3 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 2 1 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (177-180) |

Estenosis sin espondilolistesis

Con comorbilidad
 Duración de síntomas < 6 meses
 Extensión de la estenosis por diagnóstico por imagen >2 niveles

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 3 1 0 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (181-184) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 6 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 2 1 0 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 3 1 1 0 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | (185-188) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 3 2 2 0 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 2 2 1 2 1 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 2 1 1 0 1 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 1 3 0 0 1 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3D | (189-192) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 3 2 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 3 3 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (193-196) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 3 2 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 3 1 1 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 1 2 4 0 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | (197-200) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 2 1 3 0 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 0 2 2 2 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 2 1 2 1 0 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 1 2 1 2 0 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (201-204) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 3 0 2 3 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 2 0 2 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 2 2 2 0 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 2 0 2 1 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (205-208) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 2 0 3 1 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 2 2 2 0 0 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4D | 0 2 0 1 2 2 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | (209-212) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 1 1 1 3 0 0 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4D | 0 1 2 1 1 2 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 0 2 3 0 1 0 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 0 2 1 1 1 0 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (213-216) |

Estenosis sin espondilolistesis

Con comorbilidad
 Duración de síntomas ≥ 6 meses
 Extensión de la estenosis por diagnóstico por imagen ≤ 2 niveles

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>7 1 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>6 2 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>3 2 2 0 0 2 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | <u>3 2 0 2 1 1 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | (217-220) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>5 3 0 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>5 1 1 1 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>2 1 2 2 0 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>2 0 1 3 1 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (221-224) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>3 1 1 0 1 3 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>2 1 1 1 2 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>2 0 2 1 0 1 2 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4D | <u>1 0 2 1 0 2 1 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6D | (225-228) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>4 4 0 1 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | <u>4 0 2 2 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>2 1 4 0 1 1 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | <u>2 0 1 2 3 1 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (229-232) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>3 5 0 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | <u>1 1 3 1 3 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>1 1 3 2 0 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>0 0 2 3 2 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (233-236) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>1 1 3 0 1 2 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>0 1 1 1 2 2 2 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>0 1 2 2 0 1 3 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4D | <u>0 0 0 2 2 1 2 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (237-240) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>1 2 0 1 2 2 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>1 1 1 1 2 1 1 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>1 0 2 1 0 2 3 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6D | <u>1 0 0 2 0 3 1 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (241-244) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>0 2 1 0 2 2 2 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>0 1 1 1 3 1 1 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>0 0 2 1 0 1 4 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 0 1 1 1 4 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (245-248) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>0 0 1 2 0 0 4 1 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 1 0 2 1 2 3 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 0 1 1 1 4 1 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 0 0 1 0 2 6 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8A | (249-252) |

Estenosis sin espondilolistesis

Con comorbilidad
 Duración de síntomas ≥ 6 meses
 Extensión de la estenosis por diagnóstico por imagen > 2 niveles

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>6 2 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>5 3 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>4 2 1 0 0 2 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | <u>3 0 1 2 2 1 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (253-256) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>5 2 1 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>4 1 2 1 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | <u>2 2 3 0 0 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | <u>2 0 1 3 1 0 2 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (257-260) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>3 1 1 1 1 2 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>2 1 1 1 3 1 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>2 0 2 1 1 1 1 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>1 0 2 1 0 2 2 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6D | (261-264) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>4 3 0 1 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | <u>3 2 1 1 2 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | <u>2 2 2 0 1 2 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>1 1 1 2 2 2 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (265-268) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>4 2 1 0 2 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | <u>1 1 3 0 4 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>1 2 2 1 0 2 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>0 0 1 2 4 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5A | (269-272) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>1 1 2 1 1 2 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>0 1 0 1 3 3 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5A | <u>0 1 2 1 1 2 2 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>0 0 0 1 2 2 3 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (273-276) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>1 2 0 2 2 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>1 1 1 0 4 1 0 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>1 0 2 1 1 2 2 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>1 0 0 2 0 5 0 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6A | (277-280) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>0 2 1 1 2 2 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>0 1 1 1 1 3 1 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 2 1 1 1 3 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 0 1 1 3 2 1 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (281-284) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>0 0 1 2 1 1 3 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 1 0 2 2 2 1 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 0 1 2 2 2 1 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 0 0 1 2 1 4 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8I | (285-288) |

Espindilolistesis

Sin comorbilidad
 Duración de síntomas < 6 meses
 Grado I por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|--|--|--|--|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 4 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (289-292) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 2 3 3 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 3 2 0 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (293-296) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 4 1 0 0 3 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 2 2 1 0 1 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 0 3 1 2 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 2 1 2 1 1 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (297-300) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 3 2 0 1 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 2 2 0 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | (301-304) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 1 3 0 2 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | (305-308) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 1 1 2 0 3 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 2 1 1 1 3 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 0 3 1 1 1 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | 0 0 0 4 0 1 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (309-312) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 2 1 0 1 3 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 2 0 0 1 4 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (313-316) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 1 1 1 0 4 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 2 0 0 2 4 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 1 2 0 2 1 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | 0 0 1 1 2 0 3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (317-320) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 1 1 1 1 2 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 1 1 1 2 3 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 0 0 1 1 2 3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (321-324) |

Espondilolistesis

Sin comorbilidad
 Duración de síntomas < 6 meses
 Grado > I por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (325-328) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 2 2 0 2 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 0 4 0 1 0 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | (329-332) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 2 1 2 0 2 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 0 2 1 1 1 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | 1 0 3 0 3 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 0 2 2 0 0 4 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (333-336) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 3 2 1 0 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 1 2 1 2 3 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 1 1 0 2 1 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5A | 1 1 0 0 1 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (337-340) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 3 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 1 1 2 3 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 2 1 0 1 2 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6D | 0 1 1 0 1 2 2 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (341-344) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 1 1 1 1 2 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 1 0 3 2 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 2 0 0 3 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 2 0 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (345-348) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 2 0 0 1 2 1 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 1 0 0 2 3 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 1 1 0 0 0 2 3 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 1 1 0 0 0 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7A | (349-352) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 1 0 1 1 1 2 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 1 0 0 2 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 1 1 0 0 1 3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 1 0 1 0 3 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7A | (353-356) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 1 0 1 1 1 4 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 0 1 0 3 4 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 0 0 1 1 3 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7A | (357-360) |

Espondilolistesis

Sin comorbilidad
 Duración de síntomas ≥ 6 meses
 Grado I por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|--|--|--|--|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 2 3 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 1 3 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | (361-364) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 0 2 1 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 1 4 0 1 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | 2 1 1 3 0 0 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (365-368) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 2 0 1 0 3 1 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 0 1 0 2 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 1 0 1 0 4 1 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 0 2 0 0 3 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (369-372) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 4 3 0 0 0 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 2 2 0 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 1 0 2 1 3 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (373-376) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 2 2 1 1 1 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 0 1 1 4 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5A | 1 0 1 2 1 2 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 0 0 2 1 2 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (377-380) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 0 0 2 1 4 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6A | 0 0 0 0 4 2 0 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 1 0 1 3 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 0 3 1 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (381-384) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 0 0 2 1 2 1 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 0 1 2 0 3 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 1 1 0 0 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7A | 0 0 0 2 0 0 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7A | (385-388) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 0 0 0 2 1 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 1 1 0 4 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 1 1 0 2 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8A | 0 0 0 0 1 0 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7A | (389-392) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 0 0 0 2 1 2 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 0 1 0 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 0 0 0 1 2 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8A | 0 0 0 0 0 0 2 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9A | (393-396) |

Espondilolistesis

Sin comorbilidad
 Duración de síntomas ≥ 6 meses
 Grado > I por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>7 1 0 1 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>4 2 1 0 2 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | <u>3 1 3 0 1 1 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | <u>2 0 2 1 2 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (397-400) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>3 3 2 1 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | <u>2 0 1 2 2 2 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>2 0 2 1 2 0 2 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>1 0 1 2 0 1 3 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (401-404) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>2 0 1 2 0 1 3 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4D | <u>1 0 1 0 1 1 2 3 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 2 1 2 0 2 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>0 0 1 1 0 1 2 3 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (405-408) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>2 3 1 1 0 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | <u>0 2 2 1 2 1 0 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>1 0 1 2 0 3 2 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 1 1 0 3 3 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (409-412) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>1 1 3 1 1 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>0 0 1 3 2 2 0 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5A | <u>0 0 1 2 1 1 4 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 0 2 0 1 2 4 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (413-416) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>0 0 0 2 2 1 2 1 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 0 0 4 0 1 3 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 0 0 2 2 2 1 2</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 0 0 0 2 1 3 3</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8A | (417-420) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>0 0 2 0 2 2 2 0 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 0 2 0 4 0 2 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 1 1 0 1 2 3 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 0 2 0 0 1 3 3</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8A | (421-424) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>0 0 0 2 1 3 2 0 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 0 1 0 5 0 2 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 0 1 1 1 0 5 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8I | <u>0 0 0 0 1 0 2 1 5</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9A | (425-428) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>0 0 0 0 2 1 2 2 2</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 0 0 0 2 2 2 3</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8A | <u>0 0 0 0 0 1 2 4 2</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8A | <u>0 0 0 0 0 0 2 0 7</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9A | (429-432) |

Espindilolistesis

Con comorbilidad
Duración de síntomas < 6 meses
Grado I por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|--|--|--|--|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 4 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (433-436) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 2 3 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | (437-440) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 4 0 1 2 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 3 0 1 1 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 0 3 2 1 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 1 2 2 0 3 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (441-444) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 7 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 4 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 3 2 0 1 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 2 2 1 0 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | (445-448) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 4 1 1 1 0 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 1 3 1 1 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 2 2 1 0 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 1 2 1 1 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (449-452) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 1 1 1 2 0 4 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 1 1 1 2 3 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 0 3 1 1 1 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | 0 0 0 2 1 4 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6A | (453-456) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 1 1 1 3 0 1 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 1 0 3 1 3 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5A | 0 1 2 2 1 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4D | 0 1 0 2 2 1 2 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | (457-460) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 1 1 0 3 1 0 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 1 0 2 2 3 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 0 1 2 0 3 2 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (461-464) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 1 0 1 3 0 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 0 0 1 0 5 2 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 2 2 1 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 0 1 2 4 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (465-468) |

Espondilolistesis

Con comorbilidad
 Duración de síntomas < 6 meses
 Grado > I por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (469-472) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 3 1 0 3 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 2 1 2 1 1 0 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | (473-476) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 2 1 1 3 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 2 0 1 1 2 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 0 3 1 3 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 0 2 2 0 2 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (477-480) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 4 1 1 1 0 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 2 2 1 2 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 2 0 0 2 2 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 1 0 1 0 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (481-484) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 3 1 1 2 0 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 0 2 2 2 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 2 1 0 2 2 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 1 1 1 0 2 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (485-488) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 1 1 2 0 3 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 1 1 4 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5A | 0 0 2 0 1 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 1 1 3 1 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (489-492) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 1 0 1 2 1 3 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 1 0 1 2 4 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6A | 0 1 1 0 1 2 2 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 1 0 0 1 1 4 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (493-496) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 1 0 0 3 1 3 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5A | 0 1 0 0 3 4 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6A | 0 1 0 0 2 1 3 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 1 0 0 2 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (497-500) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 1 0 0 3 2 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 1 0 5 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 1 1 2 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 0 0 1 1 3 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7A | (501-504) |

Espondilolistesis

Con comorbilidad
Duración de síntomas ≥ 6 meses
Grado I por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>8 1 0 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>7 1 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>3 3 2 1 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | <u>3 2 2 2 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (505-508) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>6 2 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>5 0 2 1 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>2 1 4 2 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | <u>2 1 1 4 0 1 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (509-512) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>2 0 1 2 1 3 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>1 0 1 0 2 3 1 1 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>1 0 1 1 3 1 2 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>0 0 1 1 0 4 1 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (513-516) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>4 3 0 0 1 1 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | <u>3 1 2 1 2 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>2 1 3 1 0 1 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | <u>2 1 0 3 1 2 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (517-520) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>2 4 0 1 1 1 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | <u>1 2 1 1 4 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>1 1 1 3 0 2 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>1 0 1 2 1 3 1 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | (521-524) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>0 0 1 2 3 3 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5A | <u>0 0 0 2 3 2 2 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5A | <u>0 0 1 0 2 2 4 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 0 0 1 2 4 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (525-528) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>0 1 3 1 0 2 2 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | <u>0 0 2 2 0 2 3 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 1 2 0 2 2 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 0 1 2 0 4 1 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (529-532) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>0 1 0 2 2 2 2 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | <u>0 0 1 1 2 2 3 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | <u>0 0 0 2 1 1 3 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 0 0 1 1 5 1 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7A | (533-536) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>0 0 1 0 2 1 3 2 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 0 1 0 3 1 3 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 0 0 1 3 3 1 1</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | <u>0 0 0 0 0 1 4 1 3</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7A | (537-540) |

Espindilolistesis

Con comorbilidad
 Duración de síntomas ≥ 6 meses
 Grado > I por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | (541-544) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 0 1 2 3 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 2 0 3 1 2 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 0 1 2 1 2 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | (545-548) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 2 0 1 2 0 4 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 0 1 0 1 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 1 1 1 2 1 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 0 1 1 0 2 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (549-552) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 2 3 0 1 0 3 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 2 0 2 1 1 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 0 2 0 1 3 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 1 0 0 1 1 3 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (553-556) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 0 3 1 1 1 3 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 0 1 2 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5A | 0 1 0 2 0 3 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 2 0 3 2 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | (557-560) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 0 0 1 2 4 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6A | 0 0 0 0 4 2 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 1 1 1 5 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 0 0 0 4 1 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (561-564) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 1 0 1 0 1 4 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 2 0 4 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 1 1 0 2 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 0 1 1 0 2 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8A | (565-568) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 0 0 0 2 1 4 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6A | 0 0 0 1 1 4 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 0 1 1 2 1 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 0 0 1 0 3 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8A | (569-572) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 0 0 0 2 1 4 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 0 0 0 3 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 0 0 0 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7A | 0 0 0 0 0 0 3 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8A | (573-576) |

Discopatías

Sin comorbilidad
 Duración de síntomas < 6 meses
 Sin confirmación por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (577-580) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (581-584) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (585-588) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (589-592) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 3 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (593-596) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 2 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (597-600) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (601-604) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 0 3 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (605-608) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (609-612) |

Discopatías

Sin comorbilidad
 Duración de síntomas < 6 meses
 Con confirmación por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|--|--|--|--|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (613-616) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (617-620) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 6 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1I | 6 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1I | 3 2 0 0 2 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | (621-624) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 6 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 3 1 0 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (625-628) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 3 0 2 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 3 3 0 0 3 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | (629-632) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 4 2 0 2 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 4 1 0 1 3 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 2 4 0 0 2 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 2 3 1 0 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | (633-636) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 3 1 1 1 3 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 1 1 0 4 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 2 0 1 2 3 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 2 0 1 0 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | (637-640) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 3 1 0 0 5 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 2 1 0 1 3 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 2 0 1 1 2 3 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 2 0 1 0 3 2 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | (641-644) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 3 1 0 0 3 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 2 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 0 2 0 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 1 0 2 0 2 1 2 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | (645-648) |

Discopatías

Sin comorbilidad
 Duración de síntomas ≥ 6 meses
 Sin confirmación por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (649-652) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (653-656) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 6 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (657-660) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (661-664) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (665-668) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (669-672) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (673-676) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (677-680) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 0 2 0 1 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (681-684) |

Discopatías

Sin comorbilidad
 Duración de síntomas ≥ 6 meses
 Con confirmación por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|--|--|--|--|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 1 3 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (685-688) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 4 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 4 3 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 1 3 0 0 0 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | (689-692) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 4 1 3 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 2 2 1 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 1 1 1 1 0 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (693-696) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 3 4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 2 3 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | 2 0 5 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | 1 2 1 2 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (697-700) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 2 3 3 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 1 1 3 2 0 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 2 3 1 0 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 1 2 1 1 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (701-704) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 1 1 4 0 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 0 3 1 2 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 1 2 2 0 0 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4D | 1 1 1 0 2 1 0 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | (705-708) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 2 0 0 1 3 2 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 1 2 0 2 0 0 2 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4D | 0 0 2 0 1 1 3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (709-712) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 2 1 0 0 3 0 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5D | 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 1 0 2 1 0 1 1 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6D | 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (713-716) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 1 1 0 1 2 2 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 1 0 1 0 2 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 1 1 2 0 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 1 0 1 1 1 0 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9I | (717-720) |

Discopatías

Con comorbilidad
Duración de síntomas < 6 meses
Sin confirmación por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>9 0 0 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>9 0 0 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>8 0 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>7 1 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (721-724) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>9 0 0 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>9 0 0 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>8 0 0 1 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>7 1 0 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (725-728) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>8 0 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>8 0 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>8 0 0 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>6 2 0 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (729-732) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>8 1 0 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>8 1 0 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>7 0 2 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>6 2 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (733-736) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>8 1 0 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>8 1 0 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>7 1 0 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>6 2 0 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (737-740) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>7 1 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>7 1 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>7 1 0 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>5 3 0 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (741-744) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | <u>7 1 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>7 1 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>7 0 1 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>6 0 2 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (745-748) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | <u>7 1 1 0 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>7 1 0 1 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>7 0 1 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>5 1 2 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (749-752) |
| Dolor severo en miembros inferiores | <u>7 1 0 1 0 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>7 1 0 0 1 0 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>5 2 1 0 0 1 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | <u>5 0 3 0 0 1 0 0 0</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (753-756) |

Discopatías

Con comorbilidad
Duración de síntomas < 6 meses
Con confirmación por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|--|--|--|--|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 0 3 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (757-760) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 4 0 3 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A | (761-764) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 4 3 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | (765-768) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 3 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 4 3 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (769-772) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 2 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 2 3 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | (773-776) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 3 3 0 2 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 3 1 0 2 3 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 2 3 1 1 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | 2 3 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2I | (777-780) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 2 2 0 3 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 2 0 2 3 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 2 0 2 1 3 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (781-784) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 2 2 0 3 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 2 2 0 2 2 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 2 0 2 1 2 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 2 0 1 2 2 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (785-788) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 2 2 0 1 2 0 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 2 1 0 2 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 0 2 2 2 0 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 1 0 2 2 1 1 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (789-792) |

Discopatías

Con comorbilidad
Duración de síntomas ≥ 6 meses
Sin confirmación por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|---|---|---|---|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (793-796) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (797-800) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (801-804) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (805-808) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (809-812) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (813-816) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (817-820) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 0 3 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (821-824) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 6 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 0 2 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | (825-828) |

Discopatías

Con comorbilidad
Duración de síntomas ≥ 6 meses
Con confirmación por diagnóstico por imagen

| | Sin claudicación neurológica | | Con claudicación neurológica | | Indicación N° |
|--|--|--|--|--|---------------|
| | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | Funcionalidad (Owestry ≤40) | Funcionalidad (Owestry > 40) | |
| Sin dolor de espalda | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 5 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (829-832) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 4 1 3 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 2 2 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | (833-836) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 4 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 3 0 3 2 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 3 0 2 1 0 3 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 3 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (837-840) |
| Con dolor de espalda leve o moderado | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 5 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A | 3 2 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | (841-844) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 3 4 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A | 2 1 2 1 3 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 0 4 2 2 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 0 1 3 1 3 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | (845-848) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 1 2 3 1 0 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3I | 1 0 2 2 2 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 2 2 2 0 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 1 1 0 4 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | (849-852) |
| Con dolor de espalda severo | | | | | |
| Sin dolor en miembros inferiores | 2 1 1 2 1 0 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 2 0 0 3 3 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 1 2 2 1 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4I | 0 1 1 0 1 1 4 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (853-856) |
| Dolor leve o moderado en miembros inferiores | 2 1 0 1 2 1 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 1 1 0 3 1 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5I | 0 0 2 1 1 3 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 2 0 0 2 3 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | (857-860) |
| Dolor severo en miembros inferiores | 0 1 1 0 2 1 4 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 1 0 1 0 4 0 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6I | 0 0 1 1 1 1 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7I | 0 0 1 0 1 1 1 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8I | (861-864) |